

トポロジー 演習問題 (2018年5月23日)

問題1. 群 G の位相空間 X への真性不連続な作用は自由であることを示せ.

問題2. 位相空間 X 上の被覆 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ が与えられたとする.

(a) p は開写像であることを示せ.

(b) \tilde{X} に同値関係 \sim を以下で定める: $\tilde{x} \sim \tilde{x}' \Leftrightarrow p(\tilde{x}) = p(\tilde{x}')$. このとき, 商空間 \tilde{X} / \sim は X と同相であることを示せ.

問題3. 群 G が位相空間 X に自由に作用するとし, $p : X \rightarrow X/G$ を自然な射影とする. このとき, 任意の点 $\bar{x} \in X/G$ の逆像の濃度 $\text{Card}(p^{-1}(\bar{x}))$ は, G の濃度 $\text{Card}(G)$ と一致することを示せ.

問題4. 以下の群作用が真性不連続であることを示せ.

$$(a) \mathbb{Z} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (n, x) \mapsto n + x.$$

$$(b) \mathbb{Z} \times (\mathbb{R} \times [-1, 1]) \rightarrow \mathbb{R} \times [-1, 1] \quad (n, x, y) \mapsto (n + x, (-1)^n y).$$

問題5. 以下の群作用が自由であることを示せ.

$$(a) \mathbb{Z}_2 \times S^n \rightarrow S^n, \quad ((-1)^a, x_0, \dots, x_n) \mapsto ((-1)^a x_0, \dots, (-1)^a x_n).$$

$$(b) \mathbb{Z}_k \times S^{2m+1} \rightarrow S^{2m+1}, \quad (e^{2\pi i n/k}, z_0, \dots, z_m) \mapsto (e^{2\pi i n/k} z_0, \dots, e^{2\pi i n/k} z_m).$$

ただし, 自然数 k に対して, $\mathbb{Z}_k = \{e^{2\pi i n/k} \in \mathbb{C} \mid n = 0, \dots, k-1\}$ は位数 k の巡回群である. また (a) の S^n と (b) の S^{2m+1} は以下で定義するものとする.

$$S^n = \{(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_0^2 + \dots + x_n^2 = 1\},$$

$$S^{2m+1} = \{(z_0, \dots, z_m) \in \mathbb{C}^{m+1} \mid |z_0|^2 + \dots + |z_m|^2 = 1\}.$$

以上.

解答例

問題 1. 群 G は位相空間 X に真性不連続に作用するので、任意の $x \in X$ は以下の性質を満たす開近傍 $V \subset X$ を持つ: $g \neq 1 \Rightarrow V \cap gV = \emptyset$. $x \in V$ である一方で $gx \in gV$ であるので、 $x \neq gx$ である。すなわち、任意の $x \in X$ と任意の $g \in G$, ($g \neq 1$) に対して $gx \neq x$ であるので、群 G の X への作用は自由である。

問題 2.

- (a) $\tilde{U} \subset X$ を開集合とする。 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ が被覆であることより、各 $x \in p(\tilde{U}) \subset X$ に対して、 $x \in U_x \subset X$ となる開集合 U_x であって、

$$(1) \quad p^{-1}(U_x) = \bigcup_{j \in J_x} \tilde{U}_x^j,$$

$$(2) \quad j \neq j' \Rightarrow \tilde{U}_x^j \cap \tilde{U}_x^{j'} = \emptyset,$$

$$(3) \quad p|_{\tilde{U}_x^j} : \tilde{U}_x^j \rightarrow U_x$$
 は同相である,

というものが存在する。すると、次が成り立つ:

$$\tilde{U} = \bigcup_{x \in p(\tilde{U}), j \in J_x} \tilde{U}_x^j \cap \tilde{U}, \quad p(\tilde{U}) = \bigcup_{x \in p(\tilde{U}), j \in J_x} p(\tilde{U}_x^j \cap \tilde{U}).$$

$\tilde{U} \subset X$ が開集合だったので、 $\tilde{U}_x^j \cap \tilde{U}$ は \tilde{U}_x^j の開集合である。 (3) より $\tilde{U}_x^j \cap \tilde{U} \subset \tilde{U}_x^j$ は、 p による像 $p(\tilde{U}_x^j \cap \tilde{U}) \subset U_x$ に同相である。従って、 $p(\tilde{U}_x^j \cap \tilde{U})$ は U_x の開集合である。 U_x は X の開集合だったので、 $p(\tilde{U}_x^j \cap \tilde{U})$ は X の開集合である。結果として、 $p(\tilde{U})$ は X の開集合 $p(\tilde{U}_x^j \cap \tilde{U})$, ($x \in p(\tilde{U})$, $j \in J_x$) の和集合になっているので、 $p(\tilde{U})$ 自身も開集合である。

- (b) $\tilde{x} \sim \tilde{x}'$ ならば $p(\tilde{x}) = p(\tilde{x}')$ であるので、連続写像 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ から、連続写像 $h : \tilde{X} / \sim \rightarrow X$ が、 $h([\tilde{x}]) = p(\tilde{x})$ によって誘導される。 p が全単射であることはすぐに確認できる。 (a) より p は開写像なので、 h も開写像である。すなわち、 h は同相写像である。

問題 3. $p^{-1}(\bar{x})$ と G に全単射があることを言えばよい。勝手な点 $x_0 \in p^{-1}(\bar{x})$ を選び、 $f : G \rightarrow p^{-1}(\bar{x})$ を $f(g) = gx_0$ によって定める。 $p : X \rightarrow X/G$ は自然な射影だったことから、 $p^{-1}(\bar{x}) = \{x \in X \mid \exists g \in G, gx = x_0\}$ である。これより、 f は全射であることがわかる。 f が単射であることを示すために、 $g, h \in G$, $g \neq h$ が与えられたとする。 G の X への作用が自由だったことから、 $h^{-1}gx_0 \neq x_0$ である。 $h : X \rightarrow X$ は全単射であるので、 $gx_0 \neq hx_0$ である。すなわち f は単射である。

問題 4.

- (a) 実数 ϵ を $0 < \epsilon < 1/2$ となるように選ぶ。各 $x \in X$ に対して、 $V_x = (x - \epsilon, x + \epsilon)$ と定める。任意の $n, n' \in \mathbb{Z}$, $n \neq n'$ に対して、 $x' = x + n$ および $m = n' - n \neq 0$ とおくと、以下が成り立つ:

$$\begin{aligned} nV_x \cap n'V_x &= (x + n - \epsilon, x + n + \epsilon) \cap (x + n' - \epsilon, x + n' + \epsilon) \\ &= (x' - \epsilon, x' + \epsilon) \cap (x' + m - \epsilon, x' + m + \epsilon). \end{aligned}$$

$m > 0$ ならば $\epsilon < m - \epsilon$ が成り立ち、 $m < 0$ ならば $m + \epsilon < -\epsilon$ が成り立つ。従って、 $nV_x \cap n'V_x = \emptyset$ であり、今考えている群作用は真性不連続である。

- (b) 実数 ϵ を $0 < \epsilon < 1/2$ となるように選び、各 $x \in X$ に対して、 $V_x = (x - \epsilon, x + \epsilon) \times [-1, 1]$ と定める。すると、上と同じ議論により、 $nV \cap n'V = \emptyset$ であることが示せる。

問題 5.

- (a) 各 $x \in S^n$ と $-1 \in \mathbb{Z}_2$ に対して $-x \neq x$ が成り立つことを言えばよいが、それは確かに成り立っている。 $(-x = x$ が成り立つような $x \in \mathbb{R}^{n+1}$ は $x = (0, \dots, 0)$ だけだが、それは S^n には含まれない点である。)
- (b) 各 $z \in S^{2m+1}$ に対して、もし $g \in \mathbb{Z}_k$ が $gz = z$ を満たすならば、 $g = 1$ であることを示せばよい。 $z = (z_0, \dots, z_m)$ と表示すると、 $gz = z$ が成り立つのは、 $z_j = gz_j$ が $j = 0, \dots, m$ に対して成り立つとき、そのときに限る。 $z \in S^{2m+1}$ なので、 z_j のうちどれかは 0 ではない。そのとき $z_j = gz_j$ に z_j^{-1} をかければ $g = 1$ となる。