

トポロジー 演習問題 (2019年5月29日)

問題1. 群 \mathbb{Z}^2 の \mathbb{R}^2 への作用 $\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を $(m, n, x, y) \mapsto (m + x, n + y)$ によって定義し, 自然な射影 $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2$ が定める被覆を考える.

- (a) 道 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2$, $(f(t) = [t, t])$ の持ち上げ $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ であって, $\tilde{f}(0) = (1, 0)$ を満たすものを具体的に書け.
- (b) 道 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2$, $(f(t) = [2t, 3t])$ の持ち上げ $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ であって, $\tilde{f}(0) = (0, 1)$ を満たすものを具体的に書け.

問題2. $\mathbb{Z}_2 = \{\pm 1\}$ の $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ への作用 $\mathbb{Z}_2 \times S^2 \rightarrow S^2$ を $(\epsilon, x, y, z) = (\epsilon x, \epsilon y, \epsilon z)$ によって定義し, 自然な射影 $p : S^2 \rightarrow S^2 / \mathbb{Z}_2$ が定める被覆を考える.

- (a) 道 $f : [0, 1] \rightarrow S^2 / \mathbb{Z}_2$, $(f(t) = [\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, 0])$ の持ち上げ $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow S^2$ を全て記述せよ.
- (b) 道 $f : [0, 1] \rightarrow S^2 / \mathbb{Z}_2$, $(f(t) = [\cos \pi t, \sin \pi t, 0])$ の持ち上げ $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow S^2$ を全て記述せよ.

問題3. $p : \tilde{X} \rightarrow X$ を被覆とする. $x \in X$ における定值写像 $c : [0, 1] \rightarrow X$ の持ち上げ \tilde{c} は定值写像に限ることを示せ. (ヒント: 持ち上げの一意性を使う.)

問題4. $p : \tilde{X} \rightarrow X$ を被覆であって \tilde{X} が連結であるものとし, $\varphi : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ を連続写像であって $p \circ \varphi = p$ を満たすものとする. もしある点 $\tilde{x} \in \tilde{X}$ に対して $\varphi(\tilde{x}) = \tilde{x}$ が成り立つならば, φ は恒等写像であることを示せ. (ヒント: 写像 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ の持ち上げを考える.)

問題5. 被覆 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ と点 $\tilde{x}_0 \in \tilde{X}$ が与えられたとする. このとき, 写像

$$\varphi : \pi_1(X, p(\tilde{x}_0)) \rightarrow p^{-1}(p(\tilde{x}_0))$$

を, $\varphi([f]) = \tilde{f}(1)$ で定める. ここで, $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ は, 道 $f : [0, 1] \rightarrow X$ の持ち上げであって $\tilde{f}(0) = \tilde{x}_0$ を満たす(ただ一つの)ものである.

- (a) \tilde{X} が弧状連結ならば, φ は全射であることを示せ.
- (b) \tilde{X} が単連結ならば, φ は全単射であることを示せ.
- (c) \tilde{X} が連結ならば, φ は全単射 $\pi_1(X, p(\tilde{x}_0)) / p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)) \cong p^{-1}(p(\tilde{x}_0))$ を誘導することを示せ.

問題6. 全単射 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ があることを示せ.

問題7. $p : \tilde{X} \rightarrow X$ を被覆とし, $\tilde{x}_0 \in \tilde{X}$ を任意の点とする. p が誘導する準同型

$$p_* : \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow \pi_1(X, p(\tilde{x}_0))$$

は単射であることを示せ.

以上.

解答例

- 問題 1. (a) $\tilde{f}(t) = (t + 1, t)$. (b) $\tilde{f}(t) = (2t, 3t + 1)$.
- 問題 2. (a) $\tilde{f}(t) = \pm(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, 0)$. (b) $\tilde{f}(t) = \pm(\cos \pi t, \sin \pi t, 0)$.
- 問題 3. 各点 $\tilde{x} \in p^{-1}(x)$ に対して, $c_{\tilde{x}} : [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ を定値写像 $c_{\tilde{x}}(t) = \tilde{x}$ によって定める. すると, これは $pc_{\tilde{x}} = c$ を満たすので, c の持ち上げになっている. 従って, c の任意の持ち上げ \tilde{c} は, $c_{\tilde{x}}$, ($\tilde{x} \in p^{-1}(x)$) のいずれかに一致することが示せればよい. \tilde{c} が c の持ち上げであれば, $\tilde{c}(0) \in p^{-1}(x)$ である. よって c の二つの持ち上げ \tilde{c} と $c_{\tilde{c}(0)}$ は, $\tilde{c}(0) = c_{\tilde{c}(0)}(0)$ を満たしている. 持ち上げの一意性より, $\tilde{c} = c_{\tilde{c}(0)}$ である.
- 問題 4. 被覆 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ に関して, 連続写像 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ の持ち上げ $\tilde{p} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ は, $p\tilde{p} = p$ を満たすような連続写像のことである. すると φ は $p : \tilde{X} \rightarrow X$ の持ち上げである. また, \tilde{X} の恒等写像 $\text{id}_{\tilde{X}}$ も $p : \tilde{X} \rightarrow X$ の持ち上げである. これら二つの持ち上げは $\varphi(\tilde{x}) = \tilde{x} = \text{id}_{\tilde{X}}(\tilde{x})$ を満たす. 持ち上げの一意性より, $\varphi = \text{id}_{\tilde{X}}$ である.
- 問題 5.
- \tilde{X} が弧状連結なので, 各点 $\tilde{x} \in p^{-1}(p(\tilde{x}_0))$ に対して, \tilde{x}_0 から \tilde{x} への道 $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ がとれる. すると, $p\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow X$ は, $p\tilde{f}(0) = p(\tilde{x}_0) = p\tilde{f}(1)$ を満たす道なので, 基本群の要素 $[p\tilde{f}] \in \pi_1(X, p(\tilde{x}_0))$ を定める. \tilde{f} は道 $p\tilde{f}$ の持ち上げであって, $\tilde{f}(0) = \tilde{x}_0$ を満たす. 従って, $\varphi([p\tilde{f}]) = \tilde{f}(1) = x$ となり, φ が全射であることが示せた.
 - \tilde{X} が単連結であることは, 弧状連結かつ $\pi_1(\tilde{X}) \cong \{1\}$ となることであった. (a) によって φ が全射であることはわかっているので, 单射であることを以下で示すことにする. すなわち, $p(\tilde{x}_0)$ を基点とする X の二つの道 f, f' が $\varphi([f]) = \varphi([f'])$ を満たすならば, $[f] = [f']$ であることを示せばよい. φ の定義から, f と f' それぞれの持ち上げ \tilde{f} と \tilde{f}' であって $\tilde{f}(0) = \tilde{f}'(0) = \tilde{x}_0$ を満たすものは, $\tilde{f}(1) = \tilde{f}'(1)$ も満たしている. 道 $\tilde{f} * \overline{\tilde{f}'}$ は \tilde{x}_0 を基点とする \tilde{X} の道である. $\pi_1(\tilde{X}) \cong \{1\}$ なので, $\tilde{f} * \overline{\tilde{f}'}$ は \tilde{x}_0 における定値写像 $\tilde{c} : [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ に同値である: $\tilde{f} * \overline{\tilde{f}'} \sim \tilde{c}$. すると, X における道の同値 $p(\tilde{f} * \overline{\tilde{f}'}) \sim p\tilde{c}$ が得られる. $p(\tilde{f} * \overline{\tilde{f}'}) = p\tilde{f} * p\overline{\tilde{f}'} = f * \overline{f'}$ が成り立ち, $p\tilde{c}$ は $p(\tilde{x}_0)$ における定値写像であるので, $[f][f']^{-1} = 1$ が $\pi_1(X, p(\tilde{x}_0))$ の中に成り立つ. すなわち $[f] = [f']$ である.
 - (b) の証明の議論から, $[f], [f'] \in \pi_1(X, p(\tilde{x}_0))$ が $\varphi([f]) = \varphi([f'])$ を満たすときには, $p([\tilde{g}])[f'] = [f]$ が成り立っている. ここで, $[g] \in \pi_1(X, \tilde{x}_0)$ は $\tilde{g} = \tilde{f} * \overline{\tilde{f}'}$ が代表する要素である. これは, φ が单射写像 $\pi_1(X, p(\tilde{x}_0))/p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)) \cong p^{-1}(p(\tilde{x}_0))$ を誘導することを意味する. この单射が全射であることは, (a) の帰結である.
- 問題 6. 被覆 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, ($p(t) = \exp 2\pi t$) に問題 5 の結果を適用する: 基点 $\tilde{x}_0 \in \mathbb{R}$ として $\tilde{x}_0 = 0$ を選ぶ. すると, $p^{-1}(p(\tilde{x}_0)) = \mathbb{Z}$ である. \mathbb{R} は単連結なので, 問題 5 より全单射 $\varphi : \pi_1(S^1, p(0)) \rightarrow \mathbb{Z}$ が得られる. (S^1 は弧状連結なので, 基本群の基点はどこを選んでもよい.)
- 問題 7. \tilde{x}_0 を基点とする \tilde{X} の道 \tilde{f} を考える. $p\tilde{f}$ が $p(\tilde{x}_0)$ における定値写像と同値であれば, \tilde{f} が \tilde{x}_0 における定値写像と同値であることが言えれば良い. 前者の同値を与えるホモトピー $F : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ に対して, $\tilde{F}(0, 0) = \tilde{x}_0$ となる持ち上げが必ず存在する. この持ち上げ \tilde{F} が, \tilde{f} と \tilde{x}_0 における定値写像との同値を与えるホモトピーを与えている.