

## トポロジー 演習問題 (2019年6月26日)

以下,  $\mathbb{R}^n$  および  $\mathbb{C}^n$  の部分集合には,  $\mathbb{R}^n$  および  $\mathbb{C}^n$  の標準的な位相から誘導された位相が与えられているものとする.

問題1. 以下で与える連続写像  $f_0$  と  $f_1$  の間のホモトピーの例を書け.

[1]  $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ .

$$f_i : [0, 1] \rightarrow X, \quad \begin{cases} f_0(s) = (\frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2\pi s, \frac{1}{\sqrt{2}} \sin 2\pi s, \frac{1}{\sqrt{2}}), \\ f_1(s) = (\frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2\pi s, \frac{1}{\sqrt{2}} \sin 2\pi s, -\frac{1}{\sqrt{2}}). \end{cases}$$

[2]  $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$ .

$$f_i : [0, 1] \rightarrow X, \quad \begin{cases} f_0(s) = (\sqrt{2} \cos 2\pi s, \sqrt{2} \sin 2\pi s, 1), \\ f_1(s) = (\sqrt{2} \cos 2\pi s, \sqrt{2} \sin 2\pi s, -1). \end{cases}$$

[3]  $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$ .

$$f_i : [0, 1] \rightarrow X, \quad \begin{cases} f_0(s) = (0, 0, 0), \\ f_1(s) = (\cos 2\pi s, \sin 2\pi s, 1). \end{cases}$$

[4]  $X = \{((4 + \cos \theta) \cos \varphi, (4 + \cos \theta) \sin \varphi, \sin \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid \theta, \varphi \in \mathbb{R}\}$

$$f_i : [0, 1] \rightarrow X, \quad \begin{cases} f_0(s) = (4 + \cos 2\pi s, 0, \sin 2\pi s), \\ f_1(s) = (-4 - \cos 2\pi s, 0, \sin 2\pi s). \end{cases}$$

問題2. 以下で与える連続写像  $f_0 : X \rightarrow Y$  と  $f_1 : X \rightarrow Y$  の間のホモトピーであつて,  $A \subset X$  を動かさないものの例を書け.

[1]  $X = [0, +\infty)$ ,  $Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$ .

$$A = \{0\}, \quad \begin{cases} f_0(s) = (0, 0), \\ f_1(s) = (s, s^2). \end{cases}$$

[2]  $X = [0, 1]$ ,  $Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$ .

$$A = \{0, 1\}, \quad \begin{cases} f_0(s) = (\cos 2\pi s, \sin 2\pi s, 0), \\ f_1(s) = (\sqrt{1 + \sin^2 \pi s} \cos 2\pi s, \sqrt{1 + \sin^2 \pi s} \sin 2\pi s, \sin \pi s). \end{cases}$$

[3]  $X = [0, 1]$ ,  $Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z = 0\}$

$$A = \{0, 1\}, \quad \begin{cases} f_0(s) = (\cos \pi s, \sin \pi s, 1), \\ f_1(s) = (\cos \pi s, -\sin \pi s, 1). \end{cases}$$

[4]  $X = [0, 1]$ ,  $Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1\}$

$$A = \{0, 1\}, \quad \begin{cases} f_0(s) = (\cos \pi s, \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \pi s, 0), \\ f_1(s) = (\cos \pi s, -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \pi s, 0). \end{cases}$$

[5]  $X = \mathbb{R}$ ,  $Y = \mathbb{R}^2$

$$A = \{0\}, \quad \begin{cases} f_0(x) = (x, 0), \\ f_1(x) = (x, 2x). \end{cases}$$

[6]  $X = \mathbb{R}^2, Y = \mathbb{R}^3$

$$A = \{(0, 0)\}, \quad \begin{cases} f_0(x, y) = (x, y, 0), \\ f_1(x, y) = (x, x + y, y). \end{cases}$$

[7]  $X = [0, 1], Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$

$$A = \{0\}, \quad \begin{cases} f_0(x) = (x, x^2), \\ f_1(s) = (-x, x^2). \end{cases}$$

[8]  $X = [0, 1], Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$

$$A = \{0\}, \quad \begin{cases} f_0(s) = (\cos \pi s, \sin \pi s), \\ f_1(s) = (\cos \pi s, -\sin \pi s). \end{cases}$$

問題 3. 以下で与える位相空間  $X$  と、その部分空間  $\text{pt} \subset X$  であって 1 点からなるものが、ホモトピー同値であること（同じホモトピー型を持つこと）を、強変形レトラクトの例を構成することによって示せ。

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| [1] $X = [0, +\infty)$ ,                                      | $\text{pt} = \{0\}$ .         |
| [2] $X = \{(x, x^2) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0\}$ ,       | $\text{pt} = \{(0, 0)\}$ .    |
| [3] $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$ ,            | $\text{pt} = \{(0, 0)\}$ .    |
| [4] $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0\}$ ,       | $\text{pt} = \{(0, 0)\}$ .    |
| [5] $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$ ,         | $\text{pt} = \{(0, 0, 0)\}$ . |
| [6] $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ , | $\text{pt} = \{(0, 0, 0)\}$ . |

問題 4. 以下で与える位相空間  $X$  と  $Y$  のホモトピー同値の例を書け。ただし、 $\text{pt}$  は一点からなる空間を意味する。

- |     |  |
|-----|--|
| [1] | $\begin{cases} X = \text{pt}, \\ Y = \{(\cos \theta, \sin \theta, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid \theta \in \mathbb{R}\}. \end{cases}$  |
| [2] | $\begin{cases} X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}, \\ Y = \text{pt}. \end{cases}$   |
| [3] | $\begin{cases} X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}, \\ Y = \{((4 + \cos \theta) \cos \varphi, (4 + \cos \theta) \sin \varphi, \sin \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq \varphi \leq \pi, \theta \in \mathbb{R}\}. \end{cases}$ |
| [4] | $\begin{cases} X = \text{pt}, \\ Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 = 0\}. \end{cases}$  |
| [5] | $\begin{cases} X = \mathbb{R}, \\ Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid yz = 0\}. \end{cases}$   |

問題 5. 以下で与える被覆  $p : \tilde{X} \rightarrow X$ 、道  $f : [0, 1] \rightarrow X$  および点  $\tilde{x}_0 \in \tilde{X}$  に対して、 $f$  の持ち上げ  $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$  であって  $\tilde{f}(0) = \tilde{x}_0$  となるものを書け。なお、 $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$  とする。

[1]  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1, p(x) = \exp 2\pi i x.$

$$f(s) = \exp 6\pi i s, \quad \tilde{x}_0 = 0.$$

- [2]  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ,  $p(x) = \exp 2\pi i x$ .  
 $f(s) = \exp(-2\pi i s)$ ,  $\tilde{x}_0 = 1$ .
- [3]  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ,  $p(x) = \exp 2\pi i x$ .  
 $f(s) = \exp \pi i s$ ,  $\tilde{x}_0 = -1$ .
- [4]  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ,  $p(x) = \exp 2\pi i x$ .  
 $f(s) = -\exp \frac{\pi i s}{4}$ ,  $\tilde{x}_0 = \frac{1}{2}$ .
- [5]  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ,  $p(x) = \exp \pi i x$ .  
 $f(s) = \exp 2\pi i s$ ,  $\tilde{x}_0 = 0$ .
- [6]  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^1 \times S^1$ ,  $p(x, y) = (\exp 2\pi i x, \exp 2\pi i y)$ .  
 $f(s) = (\exp 2\pi i s, \exp 4\pi i s)$ ,  $\tilde{x}_0 = (1, 0)$ .
- [7]  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^1 \times S^1$ ,  $p(x, y) = (\exp 2\pi i x, \exp 2\pi i y)$ .  
 $f(s) = (\exp 2\pi i s, \exp(-3\pi i s))$ ,  $\tilde{x}_0 = (1, -1)$ .
- [8]  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^1 \times S^1$ ,  $p(x, y) = (\exp 2\pi i x, \exp 2\pi i y)$ .  
 $f(s) = (\exp \pi i s, \exp 4\pi i s)$ ,  $\tilde{x}_0 = (0, 1)$ .
- [9]  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^1 \times S^1$ ,  $p(x, y) = (\exp 2\pi i x, \exp 2\pi i y)$ .  
 $f(s) = (\exp \frac{\pi i s}{3}, \exp \frac{-4\pi i s}{5})$ ,  $\tilde{x}_0 = (0, 0)$ .
- [10]  $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^1 \times S^1$ ,  $p(x, y) = (\exp 2\pi i x, \exp \pi i y)$ .  
 $f(s) = (\exp \pi i s, \exp 2\pi i s)$ ,  $\tilde{x}_0 = (2, 2)$ .
- [11]  $p : S^1 \rightarrow S^1$ ,  $p(z) = z^2$ .  
 $f(s) = \exp 2\pi i s$ ,  $\tilde{x}_0 = 1$ .
- [12]  $p : S^1 \rightarrow S^1$ ,  $p(z) = z^2$ .  
 $f(s) = \exp \frac{\pi i s}{3}$ ,  $\tilde{x}_0 = 1$ .
- [13]  $p : S^1 \rightarrow S^1$ ,  $p(z) = z^2$ .  
 $f(s) = \exp 4\pi i s$ ,  $\tilde{x}_0 = -1$ .
- [14]  $p : S^1 \rightarrow S^1$ ,  $p(z) = z^2$ .  
 $f(s) = \exp \frac{-2\pi i s}{5}$ ,  $\tilde{x}_0 = -1$ .
- [15]  $p : S^1 \rightarrow S^1$ ,  $p(z) = z^3$ .  
 $f(s) = \exp 2\pi i s$ ,  $\tilde{x}_0 = 1$ .
- [16]  $p : S^1 \rightarrow S^1$ ,  $p(z) = z^4$ .  
 $f(s) = \exp \pi i s$ ,  $\tilde{x}_0 = i$ .
- [17]  $p : S^1 \rightarrow S^1$ ,  $p(z) = z^3$ .  
 $f(s) = \exp(-\pi i s)$ ,  $\tilde{x}_0 = \exp \frac{2\pi i}{3}$ .

[18]  $p : S^1 \rightarrow S^1, p(z) = z^3.$

$$f(s) = \exp 2\pi i s, \quad \tilde{x}_0 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}.$$

[19]  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1, p(x) = \exp 2\pi i x.$

$$f(s) = \begin{cases} \exp 2\pi i s, & (0 \leq s \leq 1/2) \\ \exp 2\pi i(3s - 1), & (1/2 \leq s \leq 1) \end{cases} \quad \tilde{x}_0 = 0.$$

[20]  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1, p(x) = \exp 2\pi i x.$

$$f(s) = \begin{cases} \exp 2\pi i s, & (0 \leq s \leq 1/2) \\ \exp(-2\pi i s), & (1/2 \leq s \leq 1) \end{cases} \quad \tilde{x}_0 = 1.$$

問題 6. 以下で与える群  $G$  の位相空間  $X$  への作用  $G \times X \rightarrow X$  から、商空間  $X/G$  への自然な射影  $p : X \rightarrow X/G, (p(x) = [x])$  によって被覆を定める。このとき、以下で与える道  $\bar{f} : [0, 1] \rightarrow X/G$  の、点  $x_0 \in X$  を始点とする持ち上げ  $f : [0, 1] \rightarrow X$  を書け。なお、 $\mathbb{Z}_p = \{\zeta \in \mathbb{C} \mid \zeta^p = 1\}$  は位数  $p$  の巡回群を意味し、自然数  $n$  に対して  $S^{2n-1} = \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n \mid |z_1|^2 + \dots + |z_n|^2 = 1\}$  とする。

[1]  $G = \mathbb{Z}, X = \mathbb{R}, G \times X \rightarrow X, ((n, x) \mapsto n + x).$

$$\bar{f}(s) = [s], \quad x_0 = 0.$$

[2]  $G = \mathbb{Z}, X = \mathbb{R}, G \times X \rightarrow X, ((n, x) \mapsto n + x).$

$$\bar{f}(s) = [2s], \quad x_0 = 1.$$

[3]  $G = \mathbb{Z}, X = \mathbb{R}, G \times X \rightarrow X, ((n, x) \mapsto n + x).$

$$\bar{f}(s) = [s/2], \quad x_0 = 0.$$

[4]  $G = \mathbb{Z}, X = \mathbb{R}, G \times X \rightarrow X, ((n, x) \mapsto n + x).$

$$\bar{f}(s) = [2s/3], \quad x_0 = 2.$$

[5]  $G = \mathbb{Z}^2, X = \mathbb{R}^2, G \times X \rightarrow X, ((m, n, x, y) \mapsto (m + x, n + y)).$

$$\bar{f}(s) = [2s, 3s], \quad x_0 = (1, 1).$$

[6]  $G = \mathbb{Z}^2, X = \mathbb{R}^2, G \times X \rightarrow X, ((m, n, x, y) \mapsto (m + x, n + y)).$

$$\bar{f}(s) = [s/2, s/3], \quad x_0 = (1, -1).$$

[7]  $G = \mathbb{Z}_2, X = S^1, G \times X \rightarrow X, ((\zeta, z) \mapsto \zeta z).$

$$\bar{f}(s) = [\exp 4\pi i s], \quad x_0 = 1.$$

[8]  $G = \mathbb{Z}_2, X = S^1, G \times X \rightarrow X, ((\zeta, z) \mapsto \zeta z).$

$$\bar{f}(s) = [\exp 2\pi i s], \quad x_0 = -1.$$

[9]  $G = \mathbb{Z}_2, X = S^3, G \times X \rightarrow X, ((\zeta, z_1, z_2) \mapsto (\zeta z_1, \zeta z_2)).$

$$\bar{f}(s) = [\exp \pi i s, 0], \quad x_0 = (-1, 0).$$

[10]  $G = \mathbb{Z}_2, X = S^3, G \times X \rightarrow X, ((\zeta, z_1, z_2) \mapsto (\zeta z_1, \zeta z_2)).$

$$\bar{f}(s) = [\cos 2\pi s, \sin 2\pi s], \quad x_0 = (1, 0).$$

以上。

## 解答

問題 1. 以下はホモトピーを与える写像の例である。他の写像であっても、(i) 定義域と値域が正しい、(ii) 連続である、(iii)  $f_0$  と  $f_1$  をつないでいる、の三点を満たしていれば答えとなる。

- [1]  $F(s, t) = (\cos \frac{\pi(2t-1)}{4} \cos \pi s, \cos \frac{\pi(2t-1)}{4} \sin \pi s, \sin \frac{\pi(2t-1)}{4})$ ,
- [2]  $F(s, t) = (\sqrt{(2s-1)^2 + 1} \cos 2\pi s, \sqrt{(2s-1)^2 + 1} \sin 2\pi s, 2s-1)$ ,
- [3]  $F(s, t) = (t \cos 2\pi s, t \sin 2\pi s, t)$ ,
- [4]  $F(s, t) = ((4 + \cos 2\pi s) \cos \pi t, (4 + \cos 2\pi s) \sin \pi t, \sin 2\pi s)$ .

問題 2. 以下はホモトピーの例である。問題 1 で注意した点に加えて、(iv)  $A$  を動かさない、という条件を満たすものは正しい答えである。

- [1]  $F(s, t) = (ts, t^2 s^2)$ ,
- [2]  $F(s, t) = (\sqrt{1 + t^2 \sin^2 \pi s} \cos 2\pi s, \sqrt{1 + t^2 \sin^2 \pi s} \sin 2\pi s, t \sin \pi s)$ ,
- [3]  $F(s, t) = (\cos \pi s, (1 - 2t) \sin \pi s, 1 + 4t(t-1) \sin^2 \pi s)$ ,
- [4]  $F(s, t) = (\cos \pi s, \frac{2s-1}{\sqrt{2}}, \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{s(1-s)} \sin \pi s)$ ,
- [5]  $F(x, t) = (x, 2tx)$ ,
- [6]  $F(x, t) = (x, tx + y, ty)$ ,
- [7]  $F(x, t) = \begin{cases} f_0((1-2t)x), & (0 \leq x \leq 1, 0 \leq t \leq 1/2) \\ f_1((2t-1)x), & (0 \leq x \leq 1, 1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$
- [8]  $F(s, t) = \begin{cases} (\cos \pi(1-2t)s, \sin \pi(1-2t)s), & (0 \leq x \leq 1, 0 \leq t \leq 1/2) \\ (\cos \pi(2t-1)s, \sin \pi(2t-1)s). & (0 \leq x \leq 1, 1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$

問題 3. 一般に、位相空間  $X$  から pt への連続写像はただ一つしかなく、それは  $X$  の点をすべて pt の 1 点に移すものである。その写像がレトラクト  $r : X \rightarrow \text{pt}$  となる。以下は  $i \circ r \simeq 1_X$  を与えるホモトピー  $H$  の例である。(ここで  $i : \text{pt} \rightarrow X$  は包含写像である。)

- [1]  $H(x, t) = tx$ ,
- [2]  $H(x, x^2, t) = (tx, t^2 x^2)$ ,
- [3]  $H(x, 0, t) = (tx, 0)$ ,
- [4]  $H(x, 2x, t) = (tx, 2tx)$ ,
- [5]  $H(x, y, 0, t) = (tx, ty, 0)$ ,
- [6]  $H(x, y, z, t) = (tx, ty, tz)$ .

問題 4. 以下、 $f : X \rightarrow Y$  と  $g : Y \rightarrow X$  が、 $X$  と  $Y$  のホモトピー同値を与える写像の例である。また、参考のため、 $g \circ f \simeq 1_X$  を与えるホモトピー  $H_X : X \times [0, 1] \rightarrow X$  やび  $f \circ g \simeq 1_Y$  を与えるホモトピー  $H_Y : Y \times [0, 1] \rightarrow Y$  も与えてある。また、以下では pt の唯一の要素を  $p$  と書くこととする:  $\text{pt} = \{p\}$ 。

- [1]  $f(p) = (1, 0, 0)$ ,
- $g(\cos \theta, \sin \theta, \theta) = p$ ,
- $H_X(p, t) = p$ ,

$$H_Y(\cos \theta, \sin \theta, \theta, t) = (\cos t\theta, \sin t\theta, t\theta).$$

[2]  $f(x, y, z) = p,$

$$g(p) = (0, 0, 1),$$

$$H_X(x, y, z, t) = (tx, ty, \sqrt{1 - t^2x^2 - t^2y^2})$$

$$H_Y(p, t) = p.$$

[3]  $f(x, y) = (4 + x, 0, y),$

$$g((4 + \cos \theta) \cos \varphi, (4 + \cos \theta) \sin \varphi, \sin \theta) = (\cos \theta, \sin \theta),$$

$$H_X(x, y, t) = (x, y),$$

$$H_Y((4 + \cos \theta) \cos \varphi, (4 + \cos \theta) \sin \varphi, \sin \theta, t)$$

$$= (4 + \cos \theta) \cos t\varphi, (4 + \cos \theta) \sin t\varphi, \sin \theta).$$

[4]  $f(p) = (0, 0),$

$$g(x, y) = p,$$

$$H_X(p, t) = p,$$

$$H_Y(x, y, t) = (tx, ty).$$

[5]  $f(x) = (x, 0, 0),$

$$g(x, y, z) = x,$$

$$H_X(x, t) = x,$$

$$H_Y(x, y, z, t) = (x, ty, tz).$$

問題 5. 被覆  $p : \tilde{X} \rightarrow X$  に対して, 道  $f : [0, 1] \rightarrow X$  の持ち上げ  $\tilde{f} : [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$  とは,  $p \circ \tilde{f} = f$  を満たす写像のことである. 始点についての条件  $\tilde{f}(0) = \tilde{x}_0$  にもとで, 持ち上げ  $\tilde{f}$  はただ一つしかない.

[1]  $\tilde{f}(s) = 3s.$

[2]  $\tilde{f}(s) = -s + 1.$

[3]  $\tilde{f}(s) = \frac{s}{2} - 1.$

[4]  $\tilde{f}(s) = \frac{s}{8} + \frac{1}{2}.$

[5]  $\tilde{f}(s) = \frac{s}{4}.$

[6]  $\tilde{f}(s) = (s + 1, 2s).$

[7]  $\tilde{f}(s) = (s + 1, \frac{3s}{2} - 1).$

[8]  $\tilde{f}(s) = (\frac{s}{2}, 2s + 1).$

[9]  $\tilde{f}(s) = (\frac{s}{6}, -\frac{2s}{5}).$

[10]  $\tilde{f}(s) = (\frac{s}{2} + 2, 2s + 2).$

[11]  $\tilde{f}(s) = \exp \pi i s.$

[12]  $\tilde{f}(s) = \exp \frac{\pi i s}{6}.$

[13]  $\tilde{f}(s) = -\exp 2\pi i s.$

[14]  $\tilde{f}(s) = -\exp \frac{-\pi i s}{5}.$

[15]  $\tilde{f}(s) = \exp \frac{2\pi i s}{3}.$

[16]  $\tilde{f}(s) = \exp \frac{\pi(s+1)}{4}.$

[17]  $\tilde{f}(s) = \exp \frac{\pi i s(2-s)}{3}.$

[18]  $\tilde{f}(s) = \exp \frac{2\pi i s(s+1)}{3}.$

[19]  $\tilde{f}(s) = \begin{cases} s, & (0 \leq s \leq \frac{1}{2}) \\ 3s - 1, & (\frac{1}{2} \leq s \leq 1) \end{cases}$

[20]  $\tilde{f}(s) = \begin{cases} s + 1, & (0 \leq s \leq \frac{1}{2}) \\ -s + 2, & (\frac{1}{2} \leq s \leq 1) \end{cases}$

## 問題 6.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| [1] $f(s) = s.$                  | [2] $f(s) = 2s + 1.$                             |
| [3] $f(s) = \frac{s}{2}.$        | [4] $f(s) = \frac{2s}{3} + 2.$                   |
| [5] $f(s) = (s + 1, 3s + 1).$    | [6] $f(s) = (\frac{s}{2} + 1, \frac{s}{3} - 1).$ |
| [7] $f(s) = \exp 4\pi i s.$      | [8] $f(s) = -\exp 2\pi i s.$                     |
| [9] $f(s) = (-\exp \pi i s, 0).$ | [10] $f(s) = (\cos 2\pi s, \sin 2\pi s).$        |